

Zuweiserinformationen // Checkliste

Interventionelle Radiologie

Sehr geehrte Kollegin,
sehr geehrter Kollege,

wir haben für Sie zusammengestellt, welche Informationen die Interventionelle Radiologie am Klinikum rechts der Isar im Allgemeinen von Zuweisern und Patienten benötigt. Falls die benötigten Informationen in Einzelfällen abweichen, klären wir das im Verlauf der Zuweisung.

Ihr Prof. Dr. med. Philipp Paprottka

Chefarzt Interventionelle Radiologie
Lehrstuhl für Interventionelle Radiologie der Technischen Universität München

Aktuelle Befunde und Bildgebung, am besten vorab

per Fax: +49 89 4140-2614

per Post: Interventionelle Radiologie

Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München
Ismaninger Straße 22
81675 München

Aktuelle Laborwerte (nicht älter als 7 Tage vor dem Eingriff)

- Serumkreatinin
- TSH (falls pathologisch: einschließlich T3 und T4)
- Quick, PTT und Thrombozyten

Informationen zu Allergien:

Ist eine Kontrastmittelallergie bekannt, so evaluieren wir:

- Röntgen-/CT-Kontrastmittel?
- MRT-Kontrastmittel?
- anderes Kontrastmittel?
- alternatives Bildgebungsverfahren möglich?
- Prämedikation des Patienten?

Zuweiserinformationen // Checkliste

Interventionelle Radiologie

Sonstige relevante Vorerkrankungen, Zusatzinformationen:

- Medikationsplan der Patientin oder des Patienten
- Ggf. Hinweise zu Patiententransporten, falls die Interventionelle Radiologie den Transport des Patienten nach dem Eingriff organisieren soll
- Kontaktdaten der weiterbehandelnden Ärzte, die über Ergebnisse der Diagnose oder Intervention informiert werden sollen

Hinweise für die Weitergabe an Ihre Patientin oder Ihren Patienten:

- Halten Sie bitte eine Nahrungskarenz** von 6 Stunden vor der Intervention ein (Art und Dauer wird im ärztlichen Vorgespräch bei der Interventionellen Radiologie besprochen).
- Falls Sie eine **normale Nierenfunktion haben und Metformin einnehmen:**
Setzen Sie **Metformin** in Abstimmung mit Ihrem Arzt nach der Kontrastmittelgabe für 48 h ab.
- Falls Sie eine **eingeschränkte Nierenfunktion haben und Metformin einnehmen:**
Wir empfehlen Ihnen, in Abstimmung mit Ihrem Arzt, **Metformin** 48 h vor bis 48 h nach der Kontrastmittelgabe abzusetzen.
- Bitte verzichten Sie** nach Gabe von **Buscopan** oder Gabe von **H1/H2-Hemmern bei KM-Allergie** 24 Stunden nach der Untersuchung auf das **Autofahren**.
- Bitte verzichten Sie auch bei einer Gabe von **Sedativa und Analgetika während des Eingriffs** 24 Stunden nach dem interventionellen Eingriff auf das Autofahren.

Bitte bringen Sie folgende Dokumente mit:

- Versichertenkarte des Patienten/der Patientin
- Überweisung (bei gesetzlich Versicherten) an „Interventionelle Radiologie“
(mit Angabe von Diagnose und Fragestellung)